Newsarchiv

29.01.2013

Der Normalwert der Plasma-Osmolalität

Aus einer aktuellen Publikation wird der Normalwert der Plasma-Osmolalität abgeleitet: Nur die gemessene oder berechnete Osmolalität (mosmol/kg H_2O) kann den osmotischen Druck (Tonizität) charakterisieren.

20.01.2013

Fortbildung zum Säure-Basen-Haushalt

Ein misslungener Fortbildungsbeitrag [Anaesthesist 2012; 61: 989 - 1078] wird unter Fehler & Gefahren korrigiert: Un-praktische Diagnostik des SBH: Augsburger Irrtümer

04.09.2012

Mortalität der Sepsis

Ausgelöst durch die Perner-Arbeit (N Engl J Med 2012) mit einer 30Tage-Mortalität von 36,5 bzw. 39,6 % wird die Entwicklung der Mortalität der Sepsis international und national untersucht.

20.08.2012

Fibrinogen-Marketing

Die Kooperation zwischen CSL Behring (Marburg) und TEM International (München) erweckt den Eindruck, als ob das Fibrinogen-Marketing „optimiert“ werden sollte.

29.07.2012

VISEP: Nachfolge-Studie 2012

Nach der VISEP-Studie (2008) ist nun im NEJM die zweite insuffiziente Arbeit zu HES und Sepsis erschienen: Die Stellungnahme zu Perner et al. (2012) zeigt eindeutig, dass die Ergebnisse nicht verwertbar sind, weil die Dokumentation dieser Arbeit nicht der Leitlinie der Deutschen Sepsis-Gesellschaft genügt.

12.06.2012

Physioklin im neuen Design

Seit 2004 ist unser Internetauftritt um mehr als 50 neue Beiträge erweitert worden. Jetzt wurde die Webseite umfassend überarbeitet und präsentiert sich in einem neuen Design. Mit einer modernen Navigationsstruktur sind die Inhalte auch für alternative Ausgabeformate wie Smartphone und Tablet aufbereitet worden.

11.06.2012

Das Molekulargewicht des Hämoglobins

Es wird empfohlen, bei der Umrechnung der Hb-Konzentration von g/dl bzw. g/l in die SI-Einheit mmol/l als Molekulargewicht des Hämoglobins das des tetrameren Hb von 64458 g und nicht das des monomeren Hb von 16115 g zu verwenden.

10.04.2012

Volumen- und Hämotherapie beim Schwerverletzten

Da das Deutsche Ärzteblatt einen Leserbrief zum Thema und die Antwort der Kölner Autoren nicht angenommen hat, sind beide Beiträge nun unter Fehler und Gefahren nachzulesen.

31.01.2012

Die korrekte Berechnung des Base Excess im POC-Gerät

Der für die klinische Medizin entscheidende Wert Base Excess kann vom POC-Gerät - richtig berechnet - aus jeder arteriellen oder venösen Blutprobe gewonnen werden.

19.01.2012

Forum Gerinnungsdiagnostik

Für alle Bereiche der Hämotherapie wird mit Arginin- statt Natrium-Citrat

erstmals ein echtes Iso-Citrat als Antikoagulans vorgestellt, beschrieben in Forum 4 - Neues Citrat zur Gerinnungshemmung (CitrISO).

- vorherige
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- nächste