

# R

Radke O, Bräuer A, Mielck F, Hanekop GG, Baryalei M, Kettler D, Quintel M  
Erhaltene Spontanatmung und stabile Hämodynamik trotz schwerer  
akzidentieller Hypothermie (22 °C)  
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2004; 39: 32 - 37

Raum M, Rixen D, Linker R, Gregor S, Holzgraefe B, Neugebauer E, AG Schock  
und Trauma  
Beeinflussung der Plasma-Laktat-Konzentration durch laktathaltige  
Infusionslösungen  
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2002; 37: 356 - 358

Reid F, Lobo DN, Williams RN, Rowlands BJ, Allison SP  
(Ab)normal saline and physiological Hartmann's solution: A randomized double-  
blind crossover study  
Clin Sci 2003; 104: 17 - 24

Rixen D, Raum M, Bouillon B, Lefering R, Neugebauer E and the  
Arbeitsgemeinschaft "Polytrauma" of the Deutsche Gesellschaft für  
Unfallchirurgie  
Base deficit development and its prognostic significance in posttrauma critical  
illness  
An analysis by the DGU Trauma Registry. Shock 2001; 15: 83 - 89

Rixen D, Raum M, Bouillon B, Neugebauer E, AG Polytrauma der Deutschen  
Gesellschaft für Unfallchirurgie  
Der Base Excess als Prognose-Indikator bei Polytrauma-Patienten  
Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2002; 37: 347 - 349

Rutherford EJ, Morris JA, Reed GW, Hall KS  
Base deficit stratifies mortality and dertermines therapy  
J Trauma 1992; 33: 417 - 423

